

Алгоритм направления на второй этап диспансеризации

Пол, возраст пациента	Показания ко 2 этапу диспансеризации	Вид исследования	Врач-специалист/отделение	Способ записи
мужчины, женщины	1. При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением 2. В случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений 3. Подозрение на депрессию 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением	Осмотр (консультация)	Невролог	Запись с рабочего места в специально отведенные слоты
мужчины 45-72 года, женщины 54-72 года	1. При наличии комбинации 3-х факторов риска ХНИЗ: повышенный уровень АД, гиперхолестеринемия, избыток массы тела или ожирение 2. Направление врачом неврологом при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан в возрасте 65-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением	УЗДГ	Отделение функциональной диагностики	
мужчины 45, 50, 55, 60 и 64 года	При повышении ПСА более 4 нг/мл	Осмотр (консультация)	Врач-хирург/ уролог	

Пол, возраст пациента	Показания ко 2 этапу диспансеризации	Вид исследования	Врач-специалист/отделение	Способ записи
мужчины, женщины	1.Для граждан в возрасте 40-75 лет с выявленными патологическими изменениями положительном КСК 2.Отягощенная наследственность по семейному аденоматозу и (или) ЗНО толстого кишечника и прямой кишки 3.При выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования 4.По назначению врача-терапевта, врача-уролога, акушера-гинеколога в случае выявления симптомов ЗНО толстого кишечника и прямой кишки	Осмотр (консультация)	Врач – хирург/ проктолог, включая ректороманоскопию	
мужчины, женщины	По назначению хирурга (проктолога) при подозрении на ЗНО толстого кишечника	Колоноскопия	Отделение функциональной диагностики	Предварительная запись
мужчины, женщины в 45 лет	По назначению врача-терапевта при подозрении на ЗНО пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	ЭГДС	Эндоскопическое отделение	Предварительная запись
Мужчины, женщины	По назначению врача-терапевта при подозрении на ЗНО легкого	Рентгенография легких, КТ легких	Рентгенодиагностическое отделение	Запись с рабочего места в специально отведенные слоты
мужчины, женщины	1.По назначению врача-терапевта при подозрении на хроническое бронхо-легочное заболевание, курящих граждан по результатам анкетирования	Спирометрия	Центр здоровья	Без записи, в порядке живой очереди

Пол, возраст пациента	Показания ко 2 этапу диспансеризации	Вид исследования	Врач-специалист/ отделение	Способ записи
	2.Курящих граждан по направлению терапевта			
мужчины, женщины	При подозрении на сахарный диабет по назначению врача-терапевта	Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови	Лабораторное отделение	
женщины	1.Для женщин с 18 лет: выявленные патологические изменения по результатам мазка на онкоцитологию 2.Для женщин 40-75 лет: выявленные патологические изменения при проведении маммографии	Осмотр (консультация)	Акушер –гинеколог	Запись с рабочего места в специально отведенные слоты
мужчины, женщины 65 лет и старше	При наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта	Осмотр (консультация)	ЛОР	
мужчины, женщины	1.В возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное ВГД 2.В возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования	Осмотр (консультация)	Офтальмолог	
мужчины, женщины	При подозрении на ЗНО кожи и слизистых оболочек по назначению врача-терапевта	Осмотр (консультация)	Дерматовенеролог	
мужчины, женщины	1.С выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией нижних конечностей, или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным	Индивидуальное углубленное профилактическое	Отделение медицинской профилактики и центр	Предварительная запись

Пол, возраст пациента	Показания ко 2 этапу диспансеризации	Вид исследования	Врач-специалист/ отделение	Способ записи
	давлением 2.С выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и/или потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 3.Для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и/или профилактики старческой астении. 4.При выявлении высокого относительного ССР, высокого или очень высокого абсолютного ССР, и/или гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, курению более 20 сигарет в день	консультирование/ Групповое углубленное профилактическое консультирование	здоровья Школы здоровья, согласно расписанию	

