


Профилактика ИСМП

**Как избежать
сестринских ошибок,
которые угрожают
здоровью пациентов и
коллег**

7

ошибок
при проведении
манипуляций

Сбрасываете медотходы в емкость рядом с пациентом



Как правильно: во время перевязки сбрасывайте медотходы в лоток. Когда пациент выйдет, сбросьте отходы из лотка в контейнер для сбора отходов.



Не обрабатываете очки для зрения

Как правильно: если поправили очки во время манипуляции, то обработайте руки спиртовым антисептиком. Если на руках были перчатки, то снимите их, обработайте руки и наденьте новые.



Ставите лотки для манипуляций на тумбочки и кровати

Как правильно: когда проводите манипуляции в палате, завозите тележку с лекарствами и медизделиями внутрь. Вносить в палату отдельные лотки и ставить их на тумбочки, кровати нельзя

Выдаете одни халаты посетителям разных отделений



Как правильно: после первого же использования халата сбрасывайте его в отдельную корзину, а после смены передавайте использованные халаты на камерную дезинфекцию.



Выполняете манипуляции без медицинских щитков

Как правильно: надевайте щитки перед процедурами, при которых может разбрызгаться кровь и другие биожидкости. Делайте это, даже если носите очки. Они не защищают глаза полностью

Проводите манипуляции на одних и тех же простынях без стирки



Как правильно: не просите пациента после процедуры забирать простынь и носить с собой. Используйте одноразовую простынь для каждой процедуры или направляйте многоразовые в стирку

Нарушаете очередность перевязок

Алгоритм. Как организовать перевязки разного класса чистоты в одной перевязочной

- 1 Проведите перевязки пациентам, у которых нет дренажей и которым не требуется применение антисептических лекарственных средств.
- 2 Проведите перевязки пациентам с дренажами.
- 3 Проведите перевязки пациентам с изменениями в области раны, которые требуют использования антисептических лекарственных средств.
- 4 Проведите перевязки пациентам с гнойно-септическими инфекциями.
- 5 Проведите заключительную дезинфекцию в перевязочной.

Как правильно: проводите перевязки от «чистых» к «грязным». Поменять перевязки местами по желанию врача можете, только если они одной категории. Например, обе перевязки с дренажами