

Острые кишечные инфекции. Бактериальное пищевое отравление у взрослых

При температуре тела > 38°C

1. Оценка степени дегидратации
2. Активированный уголь 5000 мг размешать в воде, принять внутрь
3. Парацетамол 500 мг внутрь или Метамизол натрия 1000 мг (2 мл) в/венно

При боли в животе

1. Оценка степени дегидратации
2. Активированный уголь 5000 мг размешать в воде, принять внутрь
3. Дротаверин 40 мг (2 мл) в/мышечно

При многократной рвоте

1. Оценка степени дегидратации
2. Активированный уголь 5000 мг размешать в воде, принять внутрь
3. Метоклопрамид 10 мг (2 мл) в/мышечно

При обезвоживании*

1. Пульсоксиметрия
2. ЭКГ-мониторинг
3. Катетеризация вены или внутрикостный доступ – натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500–1000 мл в/венно капельно со скоростью 10 мл/кг/час

При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: установка второго в/венного катетера одновременно с инфузией солевого раствора: норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении декстрозы 5% в/венно через шприцевой дозатор или капельно

Маршрутизация

1. Медицинская эвакуация в больницу:
 - беременных и родильниц
 - людей из закрытых организованных коллективов
 - при отсутствии эффекта от проводимой амбулаторной терапии в течение 5 суток
 - пациентов с острыми кишечными инфекциями, прибывших из эндемичных стран в течение 5-ти дней с момента прибытия и прибывших из зарубежных стран, при наличии у них проявлений дисфункции желудочнокишечного тракта – в первые 5 дней после прибытия.
 Транспортировка на носилках при обезвоживании II, III, IV степени

2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – рекомендовать обратиться в поликлинику

3. Рекомендовать обратиться в поликлинику в клинических ситуациях, не указанных в п. 1

Маршрутизация при обезвоживании*

1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках
2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа
3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику