

Таблица. Сравнение этапов диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста

Этапы диспансеризации в 2025 году по постановлению Правительства от 27.12.2024 № 1940	Этапы диспансеризации в 2026 году по проекту Постановления Правительства «О Программе госгарантий на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» , ID проекта 161334	Изменения
Первый этап диспансеризации включает:	Первый этап диспансеризации включает:	
а) у женщин:	а) у женщин:	
прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;	прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;	Без изменений
пальпацию молочных желез;	пальпацию молочных желез;	
осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;	осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;	
микроскопическое исследование влагалищных мазков;	микроскопическое исследование влагалищных мазков	
цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo).		
Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)		
Отсутствовало назначение	У женщин в возрасте 21–49 лет: один раз в пять лет проведение определения ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции.	Новый метод исследования
Отсутствовало назначение	У женщин в возрасте 21–49 лет проведение жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки при положительном результате анализа на ВПЧ	Новый метод исследования

у женщин в возрасте 18–29 лет - проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции	женщин в возрасте 18–29 лет - проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции	Без изменений
б) у мужчин - прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии - врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	б) у мужчин - прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии - врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	Без изменений
Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа диспансеризации в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и при наличии показаний включает:	Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа диспансеризации в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и при наличии показаний включает:	Без изменений
а) у женщин: в возрасте 30 - 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции; ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла; ультразвуковое исследование молочных желез; повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;	а) у женщин: в возрасте 30 - 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции; ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла; ультразвуковое исследование молочных желез; повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;	Без изменений
б) у мужчин:	б) у мужчин:	

спермограмму;
микроскопическое исследование
микрофлоры или проведение
лабораторных исследований в
целях выявления возбудителей
инфекционных заболеваний
органов малого таза методом
полимеразной цепной реакции;
ультразвуковое исследование
предстательной железы и органов
мошонки;
повторный прием (осмотр) врачом-
урологом (при его отсутствии -
врачом-хирургом, прошедшим
подготовку по вопросам
репродуктивного здоровья у
мужчин).

спермограмму;
микроскопическое
исследование микрофлоры или
проведение лабораторных
исследований в целях
выявления возбудителей
инфекционных заболеваний
органов малого таза методом
полимеразной цепной реакции;
ультразвуковое исследование
предстательной железы и
органов мошонки;
повторный прием (осмотр)
врачом-урологом (при его
отсутствии - врачом-хирургом,
прошедшим подготовку по
вопросам репродуктивного
здоровья у мужчин).

Без изменений