

**Фрагмент протокола ВК с аргументацией в пользу препарата назначения
оригинального препарата вместо дженерика**

РЕШИЛИ: Назначить пациенту Сидорову С. С. препарат «Тритаце» (рамиприл) 5 мг 1 раз в сутки, в связи с необходимостью продолжения успешной терапии, подобранной ранее в условиях стационара ГБУЗ «Городская больница №1», и высокими рисками декомпенсации заболевания при смене лекарственной формы.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. **Анамнез:** Пациент Сидоров С. С. в течение **последних 3 лет** постоянно получал терапию оригинальным препаратом «Тритаце» 5 мг/сут. На фоне данной терапии достигнута и сохраняется **стабильная нормотензия** (целевые уровни АД 130–135/80 мм рт.ст.), отсутствуют эпизоды ортостатической гипотензии. Зафиксирована положительная динамика в виде снижения скорости клубочковой фильтрации (с 55 до 68 мл/мин/1.73м²) и стабилизации альбуминурии.
2. **Клиническое обоснование:**
 - У пациента имеется **ХБП С3а стадии на фоне диабетической нефропатии и лабильная артериальная гипертензия в анамнезе**. Любая попытка замены препарата (в том числе на дженерик) сопряжена с высоким риском развития **непредсказуемых колебаний АД и потери нефропротективного эффекта**.
 - Согласно позиции Российского кардиологического общества и актуальным клиническим рекомендациям, у пациентов с ХБП, достигших стабильного контроля АД на конкретном препарате, **не рекомендуется произвольная замена одного лекарственного средства на другое, даже с тем же МНН**, ввиду рисков нарушения комплаенса и стабильности терапии.
3. **Заключение:** Продолжение терапии оригинальным препаратом «Тритаце» является мерой **вторичной профилактики осложнений и минимизации индивидуальных рисков пациента**. Назначение данного торгового наименования медицински необходимо для поддержания достигнутого стабильного состояния и предотвращения декомпенсации основного заболевания.